

Рецептурный справочник

- спазмолитики

Rp.: Sol. Drotaverini hydrochloridi 20 mg\ml – 2 ml

D.t.d. № 5 in amp.

S. Внутримышечно по 2 мл

#

Rp.: Sol. Platyphyllini hydrotartratis 2 mg\ml – 1ml

D.t.d. № 10 in amp.

S. По 1 мл подкожно

- противорвотное

Rp.: Sol. Metoclopramidi 5 mg\ml – 2 ml

D.t.d. № 10 in amp.

S. По 2 мл внутримышечно при рвоте.

- обезболивающее

Rp.: Sol. Metamizoli natrii 500 mg\ml – 2 ml

D.t.d. № 10 in amp.

S. Внутримышечно по 2 мл при болевом синдроме

#

(тринальгин – только при панкреатите!)

Rp.: Sol. Metamizoli natrii 500 mg\ml

+Pitofenoni 2 mg\ml

+Fenpiverini bromidi 0,02 mg\ml - 5 ml

D.t.d. № 10 in amp.

S. Внутривенно по 5 мл при болевом синдроме

Опиоидные анальгетики

Rp.: Sol. Fentanyl 0,05 (0,1) mg\ml - 2 ml

D.t.d. № 5 in amp.

S. Внутривенно по 2 мл.

#

Rp: Sol. Tramadoli 50 mg\ml - 1 ml

D.t.d. № 10 in amp.

S: Вводить внутривенно медленно по 1 мл.

#

Rp.: Sol. Trimeperedini 20 mg\ml - 1 ml (Промедол)

D.t.d. N 1 in amp.

S. По 1 мл внутривенно

#

- Гемостатическое - антифибринолитическое

Rp.: Sol. Acidi tranexamici 100 mg\ml – 5 ml

D.t.d. № 5 in amp.

S. По 5 мл внутривенно медленно при кровотечении

#

Rp.: Sol. Etamsylati 125 mg\ml - 2 ml

D.t.d. № 10 in amp.

S. Внутримышечно по 2 мл при кровотечении

Вазоконстриктор (синтетический аналог вазопрессина)

Rp.: Sol. Terlipressini 0,1 mg\ml – 2 ml

D.t.d. № 5 in amp.

S. По 2 мл внутривенно при кровотечении из вен пищевода

- кристаллоидные растворы

Rp.: Sol. Natrii chloridi 0,9% - 500 ml

D.t.d. № 5

S. Внутривенно капельно 500 мл.

#

- коллоидные растворы (ГЭК)

Rp.: Sol. "Hydroxyethylkrachmal" 6% - 400 ml.

D.t.d. № 3

S.: Вводить внутривенно.

- альфа- и бета-адреномиметик

Sol. Epinephrini 1 mg\ml - 1 ml (Адреналин)

D.t.d. № 10 in amp.

S. По 1 ампуле, внутривенно капельно

#

Rp.: Sol. Norepinefrini hydrotartrati 2 mg\ml - 4 ml

D.t.d. № 10 in amp.

S.: 1 мл развести в 250 мл 5% раствора глюкозы, вводить внутривенно капельно со скоростью 15-20 капель в минуту, под контролем АД.

- Кардиотоническое средство

Rp.: Sol. Dopamini 5 mg\ml - 5 ml

D.t.d. N. 5 in amp.

S. Развести содержимое 1 ампулы в 250 мл 5% раствора глюкозы, вводить в вену капельно.

-Противосудорожное, седативное, снотворное миорелаксирующее действие

Rp.: Sol. Diazepami 5mg\ml - 2 ml

D.t.d. N 5 in amp.

S. По 2 мл внутривенно

-Противоаллергическое, противовоспалительное, противошоковое действие

Rp.: Sol. Prednisoloni 30 mg\ml - 1 ml

D.t.d. №1 in amp.

S. Вводить с 20мл 0,9% р-ра натрия хлорида внутривенно струйно.

#

Rp.: Sol. Dexamethasoni 4 mg\ml - 1 ml

D. t. d. № 5 in amp.

S. Вводить внутривенно с 20 мл. 0,9% раствора натрия хлорида.

#

- утеротоники

Rp.: Sol. Oxytocini 1 ml – 5 ME

D.t.d. № 5 in amp.

S. Внутривенно по 1 мл.